

CATALOGO DE PRODUCTOS PORCINOS



CASA MATRIZ - SANTA CRUZ

Parque Industrial 48 mza 2 #11, 6to
Anillo Av. Perimetral esq. calle
transversal.

Eimar Soto 77313922

eimar.soto@interquimicasa.com
Wilfredo Cordova 77823674
wilfredo.cordova@interquimicasa.com

SUCURSAL COCHABAMBA

Tiquipaya - Av. 1ro de Mayo
(Av. Linde) Esquina Calle Cuba

Noali Rios - 77066701

noali.rios@interquimicasa.com



En INTERQUIMICA S.A. estamos comprometidos en la búsqueda constante de soluciones para los problemas sanitarios en porcinos que afectan a nuestros clientes. Somos representantes y distribuidores de los mejores laboratorios fabricantes de productos para cerdos a nivel mundial y reconocidos por su excelente calidad. Ofrecemos una mejora continua en nuestros procesos, entrega oportuna, asistencia técnica permanente y cumplimiento de las normas legales del país, contribuyendo así a su desarrollo.



VACUNAS MSD

ANIMAL HEALTH



CIRCUMVENT PCV

Vacuna subunitaria inactivada lista para usarse como ayuda en la prevención de la viremia y en la prevención de la excreción del virus, causada por el circovirus porcino tipo 2.

Composición:

Circumvent® PCV contiene un antígeno inactivado producido por ingeniería genética por medio de un sistema vector de Baculovirus, el cual expresa el producto génico ORF2 del Circovirus porcino tipo 2.

Dosis y vía de administración

Administrar 2 ml por cerdo por vía intramuscular a partir de la tercera semana de edad. Revacunar 3 semanas después con una dosis igual.

Presentación:

Frasco de 200 ml (100dosis),
Frasco de 500 ml (250 dosis)



M+PAC

Vacuna inactivada como ayuda en la prevención de la Neumonía Enzootica Porcina, en cerdos a partir de la primera semana de vida.

Composición:

Cada dosis de 1 ml contiene:

Mycoplasma hyopneumoniae, cepa J

Dosis y vía de administración

Para grupos que utilizan un programa de 1 dosis: vacuna a los cerdos a las 6 semanas de edad o mayores con una dosis simple de 2 ml vía intramuscular. Para los grupos que utilizan un programa de dos dosis: vacune a los cerdos a los 7-10 días de edad o mayores, vía intramuscular o subcutánea, con una dosis de 1 ml seguido por una segunda dosis de 1 ml, 14 días después

Presentación:

Frascos de 50, 100 y 250 Dosis



CIRCUMVENT PCV M

Para la inmunización activa de lechones con el fin de reducir la carga viral y la excreción por circovirus porcino (PCV) tipo 2, asociadas con las enfermedades causadas por este virus y para reducir las lesiones pulmonares provocadas por la infección por Mycoplasma hyopneumoniae. La utilización de la vacuna reduce la mortalidad y la pérdida de peso durante el periodo de engorde

Composición:

Vacuna subunitaria de Circovirus Porcino Tipo 2 ORF2 (cápside) reproducida en baculovirus de línea celular de insecto (Spodoptera frugiperda Sf9) ≥ 1.3 R.P.* Asociada con Mycoplasma hyopneumoniae inactivado, cepa 11 ≥ 1.3



Dosis y vía de administración

Administrar 2 ml por vía intramuscular.

Programa De Vacunación:

Administrar 2 ml por lechón por vía intramuscular a partir de las 3 semanas de edad. Revacune 3 semanas después con una dosis igual.

Presentación:

Viales de 25, 50, 100 y 250 Dosis



VACUNAS MSD

ANIMAL HEALTH



PORCILIS MYCO SILENCER ONCE

Para la inmunización de lechones sanos como auxiliar en la prevención de la neumonía causada por Mycoplasma hyopneumoniae

Programa de vacunación:

Administre una sola dosis de 2 ml a lechones sanos a partir de las tres semanas de edad o alternativamente administrar una dosis de 1 ml a partir de la tercera semana de edad seguida de una segunda dosis de 1 ml entre 2 y 3 semanas después de la primera aplicación. La vacunación con una dosis protege hasta 6 meses.

Dosis y Administración

Administrar 1 ml o 2 ml por vía intramuscular.

Presentaciones

Frascos de 20, 50, 100, 250, y 500 ml de vacuna



PORCILIS PCV M hyo

Como una ayuda para reducir la viremia en pulmones y tejidos linfoides y reducción de la excreción de Circovirus Porcino Tipo 2, asociado a enfermedad relacionada con Circovirus Porcino Tipo 2 (PCVD). Reduce las lesiones pulmonares asociadas a la infección de Mycoplasma hyopneumoniae, la mortalidad y la pérdida de ganancia diaria de peso de cerdos afectados por PCVD y Mycoplasma hyopneumoniae durante el periodo de engorde.

Dosis y Administración

Programa de vacunación dosis única: Administrar 2 mL,
Programa de vacunación dosis repetida: Administrar en dosis repetida de 1 mL, comenzando a los 3 días de edad con un intervalo de al menos 18 días.

Presentaciones

Frascos de 10,25,50,100 y 250 Dosis



PORCILIS PCV

Para la inmunización activa de cerdos, con el fin de reducir la carga virica en sangre y tejidos linfoides y para reducir la mortalidad y pérdida de peso asociada a la infección con PCV2 que se produce durante el periodo de engorde

Dosis y Administración

Una sola dosis de 2ml a los 21 días por vía intramuscular

Presentaciones

Frascos de 10,25,50,100 y 250 Dosis



NUFLOR PREMIX

Antibiótico de amplio espectro que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas.

Indicaciones

Infecciones por Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella haemolytica Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, Lawsonia intracellularis (agente causante de ileitis), Bordetella bronchiseptica.

Dosis y Administración

La dosis recomendada es de 1 a 2 kg de Nuflor Premix por tonelada de alimento dependiendo de la severidad de la enfermedad durante 7 días o 14 días si las enfermedades fueran infección urinaria o ileitis respectivamente.

Presentaciones

Bolsa x 10 Kgs.





FLAVOMYCIN 80 %

Indicaciones
Los promotores de la Microflora son un grupo de productos, los cuales benefician directamente el intestino del animal. Flavomycin es un agente promotor de la microflora que retiene el balance protector, natural de la flora bacteriana en los intestinos. Previene los efectos perjudiciales de la producción de toxinas debido a ciertos microorganismos y limita el crecimiento de las bacterias patógenas. El resultado se observa en la mejoría de la absorción de los nutrientes del alimento, lo cual explica el aumento en el rendimiento observado

Composición
Flavofosfolipol al 80 %

Dosis y Administración
66 a 250 Gr x Tn

Presentación
Bolsa de 20 kg



RODOTIUM 80% PREMIX

Prevención, control y tratamiento de la neumonía enzoótica, actinobacilles pleuropneumonia, de la enfermedad respiratoria crónica, de la disentería, enteropathy proliferativo, spirochetosis de los puntos, síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS)

Composición
Tiamulina (hidrogenfumarato)

Dosis y Administración
100 a 120 Gr por tn durante 7 a 10 días

Presentaciones
Bolsas de 1 kg, tambores de 5 kg, 10 kg y 25 kg,



TILMOVET PREMIX 20%

Indicaciones
Tratamiento de la neumonía causada por, actinobacilles pleuro-pneumonia, mycoplasma hyopneumoniae, pasteurella multocida y otros organismos sensitivos.

Composición
Tilmicosina (como fosfato)

Dosis y Administración
16 mg/kg de peso vivo o 200 a 400 gr/Tn. Durante un periodo de 10 a 15 días.

Presentaciones
Bolsas de 1 Kg, 5 Kg y 20 Kg.



HYDRODOXX 500 mgr

Indicaciones
Prevención y tratamiento de síndrome respiratorio crónico causado por mycoplasma gallisepticum

Composición
Doxiciclina (hiclato)

Dosis y Administración
La dosis en el cerdo es de 10 mg x Kg/pv pero el producto como es al 50% la dosis es de 40 Mg x Kg/pv

Presentaciones
Bolsas de 1 kg



RODOTET PREMIX

Indicaciones
Prevención, control y tratamiento de la neumonía enzoótica, actinobacilles pleuropneumonia, de la enfermedad respiratoria crónica, de la disentería, enteropathy proliferativo, spirochetosis de los puntos, síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS)

Composición
Clortetraciclina (clorhidrato) tiamulina (hidrogenfumarato)

Dosis y Administración
Preventiva: 1 – 1.5 kg por tonelada de alimento. Tratamiento: 3 – 4.5 kg por tonelada de alimento. Las dosis terapéuticas y preventivas más altas son para enfermedades respiratorias, y las más bajas son para enfermedades gastrointestinales

Presentaciones
Bolsas de 1 kg 4.5 kg y 25 Kg, 30 g, 150 g y Tambores de 25 kg



PHARMASIN FORTE GRANULADO SOLUBLE EN AGUA PARA CERDOS

Indicacion
Es efectivo contra bronconeumonía enzoótica (con o sin infección secundaria bacteriana), rhinitis atrófica, faringitis, traqueo bronquitis; enteritis vibriónica causada por Campylobacter sp., disentería porcina; leptospirosis de cerdos causadas por Leptospira sp., Micoplasmosis causada por Micoplasma spp., infecciones causadas por microorganismos como Corynebacterium sp., Clostridium sp., Erysipelotrix rhusiopathiae, Pasteurella sp., Vibrio sp., Brucella sp., Neisseria sp., Rickettsia sp., Haemophilus sp., Chlamydia sp., Psittacosis sp. y Tachoma sp.

Composición
Tilosina 200mg
Bromhexina hidroclo rato 8 mg

Presentaciones: Bolsas de 10, 100, 200 grs. y 1 kg



FYSAL – SP

Indicaciones
Fysal SP es una mezcla sinérgica no corrosiva de los ácidos orgánicos más potentes con su sales amonio. Reduce eficazmente las bacterias Entrobacteriaceae como Salmonella tanto en materias primas y piensos compuestos con un efecto de larga duración. También purifica sistemas de alimentación en la fábrica y en la granja de aves de corral y cerdos. Los resultados que se obtienen son piensos alimenticios seguros para animales y control óptimo en la alimentación total en la cadena alimentaria

Dosis y Administración
Prevención
DESTETE 3 kg/Tn
CRECIMIENTO 2 kg/Tn
ENGORDE 1 kg/Tn
Contaminación
DESTETE 3 kg/Tn
CRECIMIENTO 4 kg/Tn
ENGORDE 2 kg/Tn

Presentaciones
Bolsas 25,40 y 1000 Kg.



TOXO – XL

Indicaciones
Protege al animal y su rendimiento de la exposición y contaminación de múltiples micotoxinas. Las esmeclitas de TOXO®-XL han demostrado ser altamente eficaces en la reducción de la biodisponibilidad de las micotoxinas. Además, la fórmula de TOXO-XL contiene biopolímeros de la glucosa específicamente seleccionados y B-glucanos purificados para reforzar la función de la barrera intestinal y el sistema inmune, que son afectados principalmente por las micotoxinas de Fusarium tales como los Tricotecenos y Fumonisin. Mitiga el deterioro del rendimiento animal causado por la exposición a micotoxinas

Dosis y Administración
Dependiendo de la calidad del grano de entre 500 gr a 2.5 kg/Tn

Presentaciones
Bolsas 25Kg.



FYLAX FORTE HC LIQUID

Indicaciones
Fylax® Forte-HC Liquid es una mezcla de ácidos orgánicos indicado para el control de hongos en granos, materias primas y alimento terminado de aves, cerdo, rumiantes y animales de compañía

Dosis y Administración
Dependiendo de la humedad de la materia prima. Desde 05 -4 kg/Tn

Presentaciones
Bolsas de 25, 220 Y 1000 Kg

SELKO-PH

Indicaciones
Mezcla sinérgica de Ácidos orgánicos modificados para acidificar el agua de bebida.

Dosis y Administración
Dependiendo de la calidad del agua entre 500 gr a 1 kg/Tn

Presentaciones
Bidones de 10, 25, 225 y 1000 kg



FYLAX SP

Mezcla sinérgica de ácidos orgánicos y sus sales de amonio utilizados como preservativos para el control de mohos para garantizar el valor nutritivo y prolongar la vida útil de las materias primas de los piensos compuestos y alimentos balanceados. Para ser utilizado en cerdos y lechones

Composición
Acido Sórbico, Acido Fórmico, Acido Acético, Acido Láctico, Acido Propiónico, Propionato de Amonio, Acido L-ascórbico, Acido Cítrico
Excipientes_1,2-propanediol, Dióxido de Silicio (siO2)

Dosis y Administración:
Desde 05 -4 kg/Tn

Presentación: Envase de 25, 220 Y 1000 Kg





miriusTM
global hygiene solutions



STERILITE DESINFECTANTE VIRICIDA (OMNICIDE)

El entorno actual plantea muchos desafíos al criador de cerdos de nuestros días. Independientemente de que la cría sea bajo techo o al aire libre, el riesgo de enfermedades no debe subestimarse. La bioseguridad y la higiene son de suma importancia para mantener estándares rigurosos en materia de bienestar en todas las áreas de la porcicultura. La peste porcina africana (PPA) puede considerarse hoy en día una de las enfermedades epidémicas más temidas de la porcicultura, al igual que la enfermedad vesicular porcina (EVP), el virus de la diarrea epidémica porcina (vDEP) y la fiebre aftosa (FA) del ganado. Asegurar una buena bioseguridad en toda la cadena de suministro es la primera línea de defensa contra estas enfermedades exóticas y emergentes. Resulta imprescindible implantar un programa de bioseguridad riguroso y eficaz para controlar y eliminar microorganismos virales, bacterianos y fúngicos que pueden reducir la productividad y el bienestar de los animales. La correcta utilización de productos de limpieza y desinfectantes también puede reducir la necesidad de antibióticos caros. OMNICIDE es un desinfectante de superficies inanimadas de amplio espectro con actividad comprobada contra bacterias grampositivas y gramnegativas, mico bacterias y mico plasmas, virus ADN y ARN lipófilos y virus ADN y ARN hidrofílicos, esporas bacterianas e hifas e esporas fúngicas.

Composición

Glutaraldehído	15%
Dimetil Cocobencil Cloruro de Amonio	10 %

Dosis y Administración

Nebulización térmica: diluya a una proporción de 1:4 y aplique a razón de 9 litros por 1000 m³
Pulverización: diluya a una proporción de 1:9 y aplique en las superficies a razón de 9 litros por 1000 m²a.
Transporte: Rocíe todas las superficies con una dilución de OmnicleanTM a 1:50 y deje actuar durante 15 minutos
Lave todas las superficies con agua limpia. (preste atención a zonas como los arcos de rueda)-
Deje secar y rocíe con OmnicideTM a 1:150

Presentaciones

Balde de 25 litros



OMNICLEAN

Indicaciones

OmnicleanTM es un detergente de espuma ideal para la primera etapa del proceso de limpieza de todas las instalaciones y criaderos donde conviven animales, incluido su transporte, así como de zonas de procesamiento de alimentos antes de realizar la desinfección definitiva, siendo este el producto idóneo para ser utilizado junto con OmnicideTM. El producto puede usarse igualmente para la limpieza de equipos y utensilios en las industrias veterinarias y procesamiento de alimentos. OmnicleanTM contiene un surfactante no iónico que elimina un gran número de residuos en suelos y superficies, tales como proteínas y grasas. OmnicleanTM no mancha en las diluciones de uso ni afecta a los metales de uso común, esmaltes vítreo y plásticos. Es estable bajo condiciones ácidas y alcalinas, y es eficaz tanto en agua caliente, fría, dura o blanda. Si bien es preferible su dilución en agua tibia y blanda.

Composición:

Cloruro de Alquil Dimetil Bencil Amonio	9.8 %
Isopropanol	3.0 %
Aminas, C12-14 Alquildimetil, N-óxidos	1.2 %
Alcoholes, ramificados y lineales, Etoxilados	6.0 %

Dosis y vía de administración

MATADEROS: Utilice OmnicleanTM diluido en 1:160 cubrir los grilletes, tuberías y demás equipamientos con Omniclean utilizando un aspersor de espuma a baja presión o un pulverizador de mochila. Deje actuar 20 minutos y lave con agua potable a baja presión.
MESAS, BANDEJAS, CARRITOS, CUCHILLOS E INSTRUMENTOS: Rocíe o sumerja en OmnicleanTM diluido en 1:320 o menos, según la cantidad de suciedad o residuos sólidos. Deje actuar durante 15 minutos y enjuague con agua potable.
SEPARADORES METÁLICOS PARA CERDOS Y AVES DE CORRAL: rocíe con una dilución de OmnicleanTM a 1:160 y lave manualmente los separadores metálicos de los compartimentos.

Presentaciones

Baldes de 25 litros

